# Определитель злаковых сорняков в посевах зерновых культур

**СТАРТ**

Лигула (язычок) — тонкий отросток, выходящий из места соединения листовой пластинки и черешка у многих представителей семейства Злаки

Лигула бахромчатая (волосовидная)

У основания листовой пластинки волосков практически нет

Семена мелкие, ости без антоциановой окраски

Setaria viridis. Щетинник зеленый (Вайнмана). Мышей зеленый

У основания листовой пластинки есть опушение

Листовая пластинка ближе к основанию покрыта волосками, стебель голый

Семена крупные, ости с антоциановой окраской

Setaria glauca. Щетинник сизый (низкий, желтоколосый). Мышей сизый

Лигулы нет

Листовая пластинка покрыта волосками по всей длине, стебель опушенный

Листья у всходов очень широкие, с волосками

Panicum miliaceum ssp. ruderale. Просо сорное (сорнополевое)

У основания листовой пластинки волосков нет

Листья у всходов довольно широкие, без опушения

Echinochloa crus-galli. Ежовник обыкновенный. Куриное (петушье) просо

Лигула мембранная

Язычок неровный, у основания листа волоски редкие

Листья у всходов узкие, без опушения, как у культурного овса

Avena fatua. Овсюг. Овес пустой (северный)

АКСИАЛ® 0,7–0,8 л/га, ТОПИК® 0,4–0,5 л/га в фазу 2–3 листа для всех однолетних злаковых сорняков

АКСИАЛ® 0,8–1,1 л/га, ТОПИК® 0,5 л/га

АКСИАЛ® 0,8–1,0 л/га, ТОПИК® 0,5 л/га

АКСИАЛ® 0,7–0,9 л/га, ТОПИК® 0,3–0,5 л/га

syngenta®