

Агроцентр Коломна. Картофель

Медьсодержащие препараты

Цель опыта

Показать действие медьсодержащих препаратов на черную ножку картофеля

Продукты для сравнения

Контроль

РИДОМИЛ® Голд Р 5 кг/га
(двукратно: 1-я в начало цветения, 2-я через 10–12 дней)

(Хлорокись меди 689,5 г/кг, цимоксанил 42 г/кг) 2,5 кг/га
(двукратно: 1-я в начало цветения, 2-я через 10–12 дней)

Фоновые обработки

1. МАКСИМ® 4 л/т (обработка клубней)
 2. ГЕЗАГАРД® 3 л/га + РЕГЛОН® Форте 2 л/га (до всходов)
 3. БОКСЕР® 2,5 л/га + (римсульфурон 250 г/кг) 0,025 кг/га (полные всходы)
 4. ШИРЛАН® 0,3 л/га (полные всходы)
 5. БОКСЕР® 2,5 л/га + (римсульфурон 250 г/кг) 0,025 кг/га (через 10 дней после предыдущей обработки гербицидами)
 6. РИДОМИЛ® Годл МЦ 2,5 кг/га (начало смыкания ботвы в рядках)
 7. КАРИАЛ® Флекс 0,5 кг/га (через 10–12 дней после предыдущей обработки фунгицидами)
 8. РЕВУС® Топ 0,6 л/га (через 10–12 дней после предыдущей обработки)
 9. РЕВУС® Топ 0,6 л/га (через 10–12 дней после предыдущей обработки)
 10. БРАВО® 3 л/га (через 10–12 дней после предыдущей обработки)
 11. ШИРЛАН® 0,4 л/га + РЕГЛОН® Форте 1,8 л/га
- Инсектицидные обработки при появлении вредителей

