

## Программа профессиональной защиты капусты белокочанной



	Посев	6 пар настоящих листьев	Завязывание — рост кочана	Созревание
<b>Гербициды</b>				
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	<b>Дуан Голд</b> 1,3–1,6 л/га (1 обработка), применение через 3–10 дней после высадки рассады после посева — до всходов культуры			
Однолетние и многолетние злаковые сорняки	<b>Фюзипад Форте</b> 0,75–2,0 л/га (1 обработка)			
<b>Инсектициды</b>				
Капустная муха	<b>Актара</b> 0,3 кг/га (полив рассады)			
Крестоцветные блошки	<b>Каратэ Зеон</b> 0,1 л/га (1 обработка)			
Совки, белянки, капустная моль			<b>Проклэйм</b> 0,2–0,3 кг/га (1–2 обработки)	<b>Проклэйм</b> 0,2–0,3 кг/га (1–2 обработки)
Тли, чешуекрылые вредители			<b>Эфория</b> 0,2–0,3 л/га (1–2 обработки)	<b>Эфория</b> 0,2–0,3 л/га (1–2 обработки)
<b>Агрехимикаты</b>				
Повышение устойчивости к стрессам, урожайности	<b>Изабион</b> 1,0–2,0 л/га (внекорневая подкормка 3 раза в течение сезона)			

## Программа профессиональной защиты моркови



	До всходов	Всходы	Семядоли	1–4 настоящих листа	Формирование корнеплода
<b>Гербициды</b>					
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	<b>Гезагард</b> 1,5–3,0 л/га (1 обработка)		<b>Гезагард</b> 1,5–3,0 л/га (1 обработка)		
			<b>Боксер</b> 2–2,5 л/га (2 обработки)*		
<b>Инсектициды</b>					
Морковная листоблошка	<b>Каратэ Зеон</b> 0,1–0,2 л/га (1 обработка)				
Морковная муха	<b>Каратэ Зеон</b> 0,1–0,2 л/га (1 обработка)				
<b>Фунгициды</b>					
Альтернариоз, мучнистая роса	<b>Скор</b> 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)				
<b>Агрехимикаты</b>					
Повышение урожайности	<b>Изабион</b> 3,0–4,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)				

\* Регистрация в 2020 году.

## Программа профессиональной защиты лука репчатого



	Посев	Всходы — 3-й настоящий лист	4-й лист — начало формирования луковички	Активный рост луковички	Перед полеганием ботвы
<b>Гербициды</b>					
Однолетние злаковые сорняки	<b>Гоал 2E</b> до 1,0 л/га (1 обработка), рекомендуются дробные обработки		<b>Боксер</b> 1,5–2 л/га (3 обработки)**		
Однолетние и многолетние злаковые сорняки	<b>Фюзипад Форте</b> 0,75–2,0 л/га (1 обработка)				
<b>Инсектициды</b>					
Луковая муха	<b>Форс</b> 10,0–15,0 кг/га (1 обработка)	<b>Актара</b> 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)	<b>Каратэ Зеон</b> 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)		
Проволочник	<b>Форс</b> 10,0–15,0 кг/га (1 обработка)				
Трипсы	<b>Актара</b> 0,2–0,4 кг/га (1–2 обработки)		<b>Эфория</b> 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)***	<b>Каратэ Зеон</b> 0,15–2,0 л/га (1–2 обработки)	
<b>Фунгициды</b>					
Пероноспороз	<b>Ридомил Голд МЦ</b> 2,5 кг/га (1–3 обработки)		<b>Ревус</b> 0,6 л/га (1–2 обработки)	<b>Квадрис</b> 0,8–1,0 л/га (1–3 обработки)	<b>Браво</b> 3,0 л/га (1–3 обработки)*
	<b>Пергадо М</b> 4,0–5,0 кг/га (1–2 обработки)				
Альтернариоз	<b>Ридомил Голд МЦ</b> 2,5 кг/га (1–3 обработки)		<b>Пергадо М</b> 4,0–5,0 кг/га (1–2 обработки)	<b>Браво</b> 3,0 л/га (1–3 обработки)*	
<b>Агрехимикаты</b>					
Повышение урожайности	<b>Изабион</b> 1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона)				

\* Лук (семенники).

\*\* Регистрация в 2020 году.

\*\*\* Регистрация в 2019 году.

## Программа профессиональной защиты столовой свеклы



	Всходы — рост растения	Начало формирования корнеплодов	Рост корнеплодов
<b>Гербициды</b>			
Однолетние злаковые сорняки	<b>Дуан Голд</b> 1,3–2,0 л/га (до всходов культуры)		
<b>Фунгициды</b>			
Церкоспороз, мучнистая роса	<b>Риас</b> 0,3 л/га (1–2 обработки)		